

**Podmiot, który uzyskał zezwolenie:**

Certis Europe B.V. Straatweg 30 B, 3604 BB Maarssen, Holandia,  
tel.: +31 346 55 24 00; fax: +31 346 55 22 74; e-mail: info@certiseurope.nl

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

Sumi-Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;  
tel.: (0-22) 637 32 37, fax: (0-22) 637 32 38,  
e-mail: biuro@sumi-agro.com.pl, www.sumi-agro.com.pl

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin  
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.**

## GRO-STOP 300 HN

**Zawartość substancji aktywnej:**

**chloroprofam** 3-chlorofenylokarbaminian izopropylu  
(związek z grupy karbaminianów) – **300 g w 1 litrze środka.**

Substancja nie będąca substancją aktywną – dichlorometan

**Zezwolenie MRiRW nr R-81/2008 z dnia 08.10.2008 r.,  
zmienione decyzją MRiRW nr R-48/2009d z dnia 26.05.2009 r.**



**Szkodliwy**



**Niebezpieczny  
dla środowiska**

Działa drażniąco na oczy i skórę.

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

**Uwaga!**

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.**
- 2. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.**
- 3. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.**
- 4. Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem.**

## I OPIS DZIAŁANIA

Gro-Stop 300 HN jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu w formie płynu do stosowania techniką aerozolowania na gorąco, przeznaczonym do stosowania w przechowalniach ziemniaka oraz w kopcach z wymuszoną wentylacją w celu zapobiegania kiełkowaniu bulw ziemniaka.

## II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

### ROŚLINY ROLNICZE

#### 1. Ziemniak

*zapobieganie kiełkowania bulw w czasie przechowywania.*

**Zalecana dawka: 15 ml/1000 kg bulw.**

Środek stosować w 3-4 tygodnie po zbiorze ziemniaków, następnie jeśli przewiduje się dłuższy okres przechowywania maksymalnie stosować 4 zabiegi co 6 tygodni.

Stosować technikę aerozolowania na gorąco, używając wytwornic aerozolu.

Przed rozpoczęciem zamgławiania należy szczelnie zamknąć budynek przechowalniczy, w przypadku kopca technicznego uszczelnić płachtami brezentowymi lub folią. Zamknąć zewnętrzne wloty wentylacyjne. Włączyć wentylatory tak, aby wewnętrzny przepływ powietrza był równomierny i delikatny. (Przed zabiegiem zaleca się wykonanie testu przepływu powietrza. Zalecana jest taka intensywność cyrkulacji powietrza, która nie powoduje gaśnięcia zapalanej zapalki umieszczonej ponad górną warstwą ziemniaków). Utrzymywać pracę wentylatorów do czasu zaniknięcia mgły w przechowalni. W celu równomiernego rozprzodzenia środka w przechowalni korzystne jest odwrócenie przepływu powietrza w czasie podawania ostatnich 10% dawki środka. Nie otwierać przechowalni lub kopca przez następne 24 godziny, po czym normalnie wietrzyć.

### UWAGI

1. Najlepsze rezultaty osiąga się stosując środek na bulwy suche, czyste, o dojrzałej skórce.
2. Środka nie stosować na ziemniaki sadzeniaki oraz na ziemniaki jadalne przeznaczone do konsumpcji przed końcem roku zbioru.
3. Nie wolno przechowywać ziemniaków sadzeniaków w skrzyniach ani pomieszczeniach i budynkach, w których stosowano Gro-Stop 300 HN.

## III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia przeznaczenia do konsumpcji

**14 DNI**

## IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

**NIE DOTYCZY POD WARUNKIEM PRZESTRZEGANIA ZASAD STOSOWANIA ŚRODKA**

## V PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

## VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

### UWAGA!

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

## VII ANTIDOTUM:

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBIAWOWE.

## VIII POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk	– (0-58) 682-04-04	Rzeszów	– (0-17) 866-44-09
Kraków	– (0-12) 683-11-34	Sosnowiec	– (0-32) 266-11-45,
Lublin	– (0-81) 740-89-83	Tarnów	– (0-14) 631-54-09
Łódź	– (0-42) 657-99-00	Warszawa	– (0-22) 619-66-54
Poznań	– (0-61) 847-69-46	Wrocław	– (0-71) 343-30-08

**Okres ważności** – 2 lata

Data produkcji – .....

Zawartość netto – .....

Nr partii – .....