

**Producent:** PHOSYN CHEMICALS Ltd, Pocklington, York YO42 1DN, U.K.  
Tel: +44 1759 302545 Fax: +44 1759 303650

**Importer:** Sumi-Agro Poland Sp. z o.o., al. Jana Paw a II 80, 00-175 Warszawa  
Tel. (0-22) 637 32 37 Fax (0-22) 637 32 38

## PHOTREL

Nawóz dolistny przeznaczony do stosowania w rzepaku i roślinach kapustnych.  
Zawiera magnez, siarkę, bor, mangan i molibden. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoboru składników oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu

### NAWÓZ WE

**Mieszanka mikroskładników pokarmowych boru (B), manganu (Mn) i molibdenu (Mo)  
z dodatkiem magnezu (Mg) i siarki (S)**

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W UZASADNIONEJ POTRZEBIE.  
NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANYCH DAWEK.

**Gwarantowana zawartość** – rozpuszczalnego w wodzie:

5% bor (B), 7% mangan (Mn), 0,4% molibden (Mo), 13,3% tlenek magnezu (MgO),  
36,3% trójtlenek siarki (SO<sub>3</sub>)

Zawiera siarczan manganu.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Nie wdychać pyłu.



**Szkodliwy**

### DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

**kapustne.**

Pierwszy zabieg wykonać w fazie umożliwiającej prawidłowe przyjęcie oprysku np. 4-6 liści właściwych w dawce 3 kg/ha.

Zaleca się powtórzenie zabiegu po 10-14 dniach.

-Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

**rzepak ozimy.**

Jesienią w dawce 3 kg/ha (zabieg ten korzystnie wpływa na przezimowanie rzepaku) i ponownie wiosną w dawce 3 kg/ha.

Zabieg wiosenny wykonać przed kwitnieniem.

**rzepak jary.**

Zabieg w fazie 4-9 liści właściwych w dawce 3 kg/ha.

Zaleca się powtórzenie zabiegu po 10-14 dniach.

-Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

**ZALECENIA W STOSOWANIU****ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE**

Odpowiednio odważoną ilość nawozu należy wsypać do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem).

Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku.

Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione.

Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

**Mieszanie z innymi produktami**

Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami.

Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.

W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznannej mieszanki na ograniczonym areale.

*Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.*

**Środki ostrożności.**

*Nie stosować na uprawy pod osłonami.*

Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz.

Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych.

Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

**PRZECHOWYWANIE**

Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności – .....

Data produkcji – .....

Zawartość netto – .....

Nr partii – .....