

**Producent:**

PHOSYN CHEMICALS Ltd, Pocklington, York YO42 1DN, U.K. Tel: +44 1759 302545  
Fax: +44 1759 303650

**Importer:** Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa  
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38, e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl

# PHOTREL Rzepak i Burak

## NAWÓZ FORMUŁOWANY

**Gwarantowana zawartość rozpuszczalnego w wodzie:**

**5% bor (B), 7% mangan (Mn),**

**0,4% molibden (Mo),**

**13,3% tlenek magnezu (MgO),**

**36.3% trójtlenek siarki (SO<sub>3</sub>)**

**Mieszanka mikrośladników pokarmowych boru (B), manganu (Mn) i molibdenu (Mo) z dodatkiem magnezu (Mg) i siarki (S)**

Nawóz dolistny przeznaczony do stosowania w rzepaku i roślinach kapustnych. Zawiera magnez, siarkę, bor, mangan i molibden. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoboru składników oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

### Nawóz WE

**UWAGA:** Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety.  
Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.

**STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W UZASADNIONEJ POTRZEBIE. NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANYCH DAWEK**



**Szkodliwy**

Zawiera siarczan manganu.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po po knięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Nie wdychać pyłu.

## DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

### Rzepak ozimy:

Jesienią w dawce 1-2 kg/ha (zabieg ten korzystnie wpływa na przezimowanie rzepaku) i późno wiosną w dawce 1-3 kg/ha.

Zabieg wiosenny wykonać przed kwitnieniem.

Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

### Rzepak jary:

Zabieg w fazie 4–9 liści właściwych w dawce 1-3 kg/ha.

Zaleca się powtórzenie zabiegu po 10-14 dniach.

Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

### Kapustne:

Pierwszy zabieg wykonać w fazie umożliwiającej prawidłowe przyjęcie oprysku (np.: faza 4–6 liści właściwych) w dawce 2-3 kg/ha.

Zaleca się powtórzenie zabiegu po 10-14 dniach.

Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

## ZALECENIA W STOSOWANIU

### ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć.

Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku.

Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

**Mieszanie z innymi produktami:** Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.

W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznannej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

**Środki ostrożności:** Nie stosować na uprawy pod osłonami.

Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

## PRZECHOWYWANIE

Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

## GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma PHOSYN CHEMICALS gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie.

Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skraj-

nych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.