

Producent: PHOSYN CHEMICALS Ltd, Pocklington, York YO42 1DN, U.K.
tel: +44 1759 302545, fax: +44 1759 303650

Importer: Sumi-Agro Poland Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
tel. (0-22) 637 32 37, fax (0-22) 637 32 38

ZINTRAC 700

Nawóz formułowany do stosowania nalistnego. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoboru cynku oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

NAWÓZ WE

Nawóz cynkowy

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W UZASADNIONEJ POTRZEBIE.
NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANYCH DAWEK.

Gwarantowana zawartość:

40% = 700 g/l cynku (Zn) całkowitego

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Unikać zrzutów do środowiska.

Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.



**Niebezpieczny
dla środowiska**

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

kukurydza.

1 l/ha w fazie 3-8 liści właściwych.

W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.

- Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

zboża.

0,5-1 l/ha od fazy 2 liści właściwych do fazy widocznego pierwszego kolanka (BBCH 12-31).

W przypadku poważnych niedoborów, zabieg należy powtórzyć po 10-14 dniach.

- Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

ziemniaki.

1 l/ha tydzień po całkowitych wschodach roślin na plantacji.
 W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
 -Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

jabłonie.

1-2 l/ha w fazie pęknięcia pąków i ponownie w końcu fazy kwitnienia.
 Nie stosować podczas kwitnienia. Można również wykonać zabieg w dawce 0,5 l/ha sześć tygodni po wykształceniu zawiązków i jeżeli jest to konieczne powtórzyć po 14-21 dniach jednak nie później niż na miesiąc przed zbiorem owoców.
 Kolejny zabieg wykonać po zbiorze owoców, ale przed żółknięciem (starzeniem) liści w dawce 1-2 l/ha.
 -Zalecana ilość wody: 200-1.000 l/ha.
 * W przypadku odmian wrażliwych na ordzawienie opóźnić pierwszy zabieg do 6 tygodni po kwitnieniu.

ZALECENIA W STOSOWANIU**ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE**

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć.

Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem).

Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku.

Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione.

Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

Mieszanie z innymi produktami.

Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.

W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznannej mieszanki na ograniczonym areale. *Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.*

Środki ostrożności.

Nie stosować na uprawy pod osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz.

Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych.

Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

PRZECHOWYWANIE

Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt. Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma PHOSYN CHEMICALS gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie.

Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunkach pogodowych i glebowych.

Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Okres ważności –

Data produkcji –

Zawartość netto –

Nr partii –